

11 rychlých tipů jak převést na Harrison's Bird Foods

Převádíme-li ptáka z jakékoliv diety na Harrison's Bird Foods, měli bychom krmit High Potency™ po dobu alespoň 6-8 měsíců

1 Podávejte Avix Bird Builder® 2-3 týdny před přechodem na nové krmení. Jód a stopové prvky obsažené v Bird Builderu® podporují zdravou chuť k jídlu a ochotu zkusit něco nového. Bird Builder® bychom měli přestat podávat, pokud pták přijímá víc než 80% granulí Harrison's v krmné dávce.




2 Harrison's Bird Bread Mix je velmi efektivní pro přechod na nové krmení. Krmení, které pták dostává v současnosti lze přidávat do těsta, ze kterého se ptačí koláč peče a postupně se nahrazuje krmením Harrison's.



3 Změna prostředí, ve kterém pták žije. Zkuste ptáčka přestěhovat do nové voliéry nebo nové klece. Odstraňte všechny hračky, bidla a misky a nabídněte High Potency™ na dno klece.



4 Použijte zrcadlo nebo bílý papír. Rozsypat krmení na zrcadlo nebo bílý papír funguje velmi dobře především u andulek. Pták dostatečně starý a socializovaný může závodit se soupeřem v zrcadle. Bílý papír přitahuje pozornost ptáčka na rozsypané krmení.



5 Pomalu „odstavte“ ptáčka ze zrní. Večer nabídněte zrní z misky jen po dobu 1 hodiny. Pak odstraňte zrní a nabídněte High Potency. Následující den ponechte nabídnuté zrní pouze 30 minut ráno a 30 minut večer. Třetí den upravte čas jen na 15 minut dvakrát denně. Čtvrtý den nabídněte pouze High Potency.™ Pečlivě hlídejte trus, jestli je v pořádku.



Poznámka: Denně bychom měli kontrolovat hmotnost ptáčka (v gramech), jeho tělesnou kondici, chování a trus. U větších ptáků minimálně dvakrát týdně.

6 Krmte ptáčka v době Vašeho jídla.
Umístěte krmivo na talíř, promíchejte ho prstem nebo lžící a předstírejte, že ho také jíte.

7 Nabídněte Power Treats, Pepper Lifetime Coarse™ nebo Adult Lifetime Mash™.

Ptáci mají velmi rádi chuť Power Treats™ a Pepper Lifetime Coarse.™ Mohou být rozdrceny na menší kousky pro menší ptáky. Adult Lifetime Mash™ Vašemu ptáčkoví díky své zajímavé chuti pomáhá zkusit něco nového.

8 Použijte jiného ptáčka jako vzor.
Máte-li možnost umístit Vašeho ptáčka blízko toho, který Harrison's Bird Foods už s chutí přijímá, velmi mu to pomůže.

9 Ohřejte nebo zvlhčete krmení.

Mírně High Potency™ ohřejte nebo zvlhčete ovocným džusem nebo Sunshine Factorem.®

10 Naplánujte si řízený přechod na nové krmení
s pomocí Vašeho veterináře. Někteří ptáci nechtějí Harrison's přijmout. Umístění na klinice, kde je ptáček v péči profesionálů, tento problém mnohdy vyřeší.

11 Pokud se přechod na nové krmení na poprvé nepodařil,
zkuste krmit zase jeho oblíbené a známé krmení a začněte s přechodem opět za nějakou dobu. Tato snaha je přeci pro zdraví Vašeho ptáčka.



Viditelné výsledky



Jak posoudit ptačí trus

Pro sběr trusu použijte čistý bílý papír.

Normální trus je při granulované stravě měkký a hnědý. Může být ale abnormálně suchý, černý nebo žlutý až zelený, pokud dostává zrní. Normální čirá moč může být přítomna ve vyšší míře, pokud ptáček dostává více ovoce a zeleniny. Normální uráty jsou krémově bílé a jsou obvykle přítomné v tekuté moči nebo jsou na povrchu pevné složky. Jakákoliv barevná změna urátů není v pořádku. Nemocný pták má jiný objem, barvu nebo konzistenci trusu. Také vylučuje méně nebo více často. Trus samic ve snášce, mláďat nebo první ranní trus mohou být většího objemu než normálně. Více moči můžeme pozorovat při nervozitě nebo i nemoci.

Normální trus

