

DOPORUČENÍ PRO POUŽITÍ PŘI NAKAŽLIVÝCH ONEMOCNĚNÍCH

APLIKACE	FREKVENCE	ŘEDĚNÍ NA 10L VODY	MINIMÁLNÍ EXPOZICE
BYDLENÍ Izolujte všechna zvířata, u kterých byla potvrzena infekce. Infikovaná mláďata musí být izolována s matkou. Odstraňte pelíšky a hračky, misky, apod. z klece nebo podlahy. Namočte pelíšek před praním do dezinfekce. Umyjte misky v teplé vodě a F10SCXD, pak postříkejte F10SC a nechte uschnout. Umyjte všechny povrchy (stoly, podlahy, dlaždice, atd.) F10SCXD.	Denně Denně Denně	40ml* 40ml* 40ml*	30min Nechat uschnout Nechat uschnout
PERSONÁL Se zvířaty by mělo manipulovat co nejméně lidí. Pohyb personálu musí být omezen. S infikovanými zvířaty a v infikovaném prostředí by se mělo pracovat naposledy, aby se zabránilo nakažení. Ochranný oděv by měl být denně dezinfikován a vyprán nebo zneškodněn. Správná dezinfekce rukou by měla být provedena po každé manipulaci s infikovaným zvířetem (F10 gel nebo tekoucí voda a F10 mýdlo)	Denně Mezi manipulací s jednotlivými zvířaty	40ml* 4ml bez ředění	Namáčet 30min, nechat uschnout 30 sekund
OBEČNĚ Trávník by měl být udržován posekaný a vystaven co nejvíce slunci. Přenosky by měly být umyté (F10SCXD) a desinfikovány (F10SC) po každém použití. Úklidové pomůcky (mopy, hadry, kartáče) je třeba na konci každého dne umýt F10SCXD a desinfikovat F10SC.	Po každém použití Po každé směně	40ml 40ml	Nechat uschnout Nechat uschnout
LÉČBA ZVÍŘAT Umyjte ihned všechna zvířata léčivým šamponem F10, abyste zabránili přenosu infekce. Opakujte třikrát po sobě obden u nemocných, týdně preventivně u zdravých zvířat. Aplikujte F10 ochrannou masť na postižené místa denně. Před nanášením masti odstraňte všechn organický materiál a starou masť pomoci F10SC (1:250).	Obden nebo dle instrukcí veterináře	Neředí se Neředí se Neředí se 40ml	Po 15 min opláchnout Po 15 min opláchnout Nechat uschnout -

*Pro parvovirové infekce použijte 80ml v 10 litrech vody

F10

PRODUCTS



VETERINÁRNÍ PRAXE



Health and Hygiene

TÉMA

PSÍ PARVOVIRUS

ČÍSLO 1



F10

PRODUCTS

DOPŘEJTE SVÝM NEJMILEJŠÍM TO NEJLEPŠÍ!

CO JE TO PSÍ PARVOVIRUS?

Parvovirus je VYSOCE INFEKČNÍ virus, který napadá střeva a poškozuje jejich sliznici. Virus je velmi malý, ale nesmírně odolný. Ve vnějším prostředí dokáže přežít měsíce až roky.

KOHO NEJVÍCE OHROŽUJE?

Psí parvovirus napadá pouze psy. Je tedy nepřenositelný na kočky nebo lidi. Tato někdy i smrtelná choroba má nejhorší průběh u štěňat mladších 6 měsíců, starých psů a predisponovaných plemen, kterými jsou rotvajler a doberman. Průběh choroby ovlivňuje mnoho faktorů - věk, prostředí, stres, parazité, vakcinace a celkový zdravotní stav psa.



PŘÍZNAKY

Deprese, silné zvracení, ztráta chuti k jídlu, horečka, profúzní zapáchající a krvavý průjem. U postižených psů se rychle rozvíjí dehydratace a těžké případy mohou končit šokem a smrtí.

LÉČBA

Specifická léčba parvovirózy psů neexistuje. (V České republice je dostupné sérum). Provádí se podpůrná léčba, dokud pacient chorobu sám nepřekoná. Včasná rehydratace je základem léčby. Psi, kteří vykazují některý z výše popsaných příznaků by měli rychle navštívit veterináře. Přežitelnost je přibližně 70%. Pro přežití je důležitá včasná veterinární péče.

JAK DOCHÁZÍ K PŘENOSU?

K přímému přenosu dochází, když se infikovaný pes potká s jiným vnímavým zvířetem – psem. Virus se ve vysoké koncentraci nachází ve stolici infikovaného psa, která je tedy zdrojem nákazy.

K nepřímému přenosu dochází rukama, na botách, na oblečení a dalších předměty jako jsou misky na vodu a žrádlo, pelíšky, atd. Virus se také přenáší v srsti a na tlapkách psů.

VŠECHNO JE KONTAMINOVANÉ – CO TEĎ?

Vzhledem k vysoké odolnosti viru, mnoho chovatelů zajímá, jak desinfikovat prostředí a jak dlouho je nutno čekat, než si přivedeme jiného psa, především jde-li o štěně.


Obrovské množství viru je infikovaným psem vylučováno stolicí i několik týdnů po setkání s virem. Postižení psi jsou tedy velkým zdrojem kontaminace prostředí.

Je důležité si uvědomit, že pokud prostředí není pravidelně a účinně dezinfikováno, není nikdy jisté, jestli není kontaminované. Parvovirus tedy může být kdekoli, ale největší pravděpodobnost nakažení je samozřejmě tam, kde se pohyboval infikovaný pes.

PREVENCE NÁKAZY

Před pořízením nového štěněte nebo při návratu vyléčeného psa od veterináře je pro bezpečí všech ostatních psů vhodné udělat následující:

- Vykoupat VŠECHNY psy, kteří jsou propuštěni od veterináře v F10 germicidním šampónu, abychom snížili množství viru v srsti.
- Ujistit se, že nově přichozí štěně je řádně vakcinováno. Je však nutné si uvědomit, že štěně je k onemocnění vnímavé ještě 2-4 týdny po posledním očkování daného očkovacího schématu. Konzultujte vakcinaci s veterinářem.



- Žádný dezinfekční přípravek (a to ani ty z mála vysoce kvalitních) nedokáže spolehlivě zničit virus v přítomnosti organického znečištění jako je jídlo, výkaly, moč, krev, sliny, tráva, hlína, atd. Opomenutí řádného úklidu hrubých nečistot před dezinfekcí prostředí vede k mylnému pocitu čistoty a bezpečí a především k velké finanční ztrátě.
- Vaše snaha při **denním** čištění a dezinfekci zvířecích pelíšků, kotců, misek na žrádlo a vodu a různých potřeb pro zvířata by měla vést ke snížení populace mikrobů na nejnižší možnou míru a tedy k vytvoření racionálně bezpečného prostředí
- Zabránit preventivními opatřeními přenosu patogenů v domácnosti nebo chovu

VÝBĚR PŘÍPRAVKŮ

Nemíchejte přípravky! Některé kombinace mohou být opravdu nebezpečné – např. čpavek a bělidla.

Bezpečnost především! Produkty z řady F10 mohou být použity na kterýkoliv povrch a mohou se používat v přítomnosti všech druhů zvířat.

Není nutné pracovat s nebezpečnými výpary a za přísných bezpečnostních opatření. Existují přípravky, které jsou účinné i bez toho, aby jste při jejich použití vypadali, jako když se chystáte do vesmíru.

Velké množství pěny ztěžuje proces čištění, proto používejte málo pěnivé prostředky.

Vždy se řiďte pokyny výrobce s ohledem na stupeň ředění, způsob aplikace, dobu působení a bezpečnostní opatření

ČTĚTE ETIKETU!

- Nenechte se zmýlit upoutávkami na etiketě. Všechny dezinfekční prostředky musí být v ČR označené podle zákona 136/2010 Sb. o biocidech a to kvůli ochraně spotřebitele. V Republice Jižní Afrika (JAR), kde se F10 produkty vyrábí, podléhá registrace dezinfekčních prostředků zákonu 36. Všechny registrované přípravky jsou přezkoušené místním Ministerstvem zemědělství. Obsah etikety byl překontrolován a ověřena jeho pravdivost. Jsou tam uvedené přesné bezpečnostní pokyny a jen úředně ověřená účinnost.
- Ověřte, zda byly prováděny testy účinnosti dezinfekčního přípravku na psí parvovirus a použijte je ten, který opravdu účinkuje!

**PREVENCE JE VŽDY
LEPŠÍ NEŽ LÉČBA**

**ZEptejte se svého
VETERINÁŘE NA
VAKCINAČNÍ SCHÉMA A
MĚJTE FIO VŽDY PO
RUCE!**