

DOPORUČENÍ PRO POUŽITÍ PŘI NAKAŽLIVÝCH ONEMOCNĚNÍCH

APLIKACE	FREKVENCE	ŘEDĚNÍ NA 10L VODY	MINIMÁLNÍ EXPOZICE
BYDLENÍ Izolujte všechna zvířata, u kterých byla potvrzena infekce. Infikovaná mláďata musí být izolována s matkou. Odstraňte pelíšky a hračky, misky, apod. z klece nebo podlahy. Namočte pelíšek před praním do dezinfekce. Umyjte misky v teplé vodě a F10SCXD, pak postříkejte F10SC a nechte uschnout. Umyjte všechny povrchy (stoly, podlahy, dlaždice, atd.) F10SCXD.	Denně Denně Denně	40ml* 40ml* 40ml*	30min Nechat uschnout Nechat uschnout
PERSONÁL Se zvířaty by mělo manipulovat co nejméně lidí. Pohyb personálu musí být omezen. S infikovanými zvířaty a v infikovaném prostředí by se mělo pracovat naposledy, aby se zabránilo nakažení. Ochranný oděv by měl být denně dezinfikován a vyprán nebo zneškodněn. Správná dezinfekce rukou by měla být provedena po každé manipulaci s infikovaným zvířetem (F10 gel nebo tekoucí voda a F10 mýdlo)	Denně Mezi manipulací s jednotlivými zvířaty	40ml* 4ml bez ředění	Namáčet 30min, nechat uschnout 30 sekund
OBECNĚ Trávník by měl být udržován posekaný a vystaven co nejvíce slunci. Přenosky by měly být umyté (F10SCXD) a dezinfikovány (F10SC) po každém použití. Úklidové pomůcky (mopy, hadry, kartáče) je třeba na konci každého dne umýt F10SCXD a dezinfikovat F10SC.	Po každém použití Po každé směně	40ml 40ml	Nechat uschnout Nechat uschnout
LÉČBA ZVÍŘAT Umyjte ihned všechna zvířata léčivým šamponem F10, abyste zabránili přenosu infekce. Opakujte třikrát po sobě obden u nemocných, týdně preventivně u zdravých zvířat. Aplikujte F10 ochrannou masť na postižené místa denně. Před nanášením masti odstraňte všechny organický materiál a starou masť pomocí F10SC (1:250).	Obden nebo dle instrukcí veterináře	Neředí se Neředí se Neředí se 40ml	Po 15 min opláchnout Po 15 min opláchnout Nechat uschnout -


*Pro parvovirové infekce použijte 80ml v 10 litrech vody

F10

PRODUCTS



VETERINÁRNÍ PRAXE




Health and Hygiene

AKNÉ, HOT SPOTY, EKZÉMY, DERMATITIDA KOŽNÍCH ZÁHYBŮ A SEBOREA

TÉMA

ČÍSLO 3



F10

PRODUCTS

BAKTERIÁLNÍ KOŽNÍ ONEMOCNĚNÍ (PYODERMIE) U PSŮ A KOČEK

Pyodermie jsou bakteriální infekce kůže. Jsou velmi časté u psů a vzácné u koček, kde jsou často spojeny se sekundární infekcí, která zpravidla komplikuje jiný zdravotní problém.

Přestože jsou zřídka fatální, mnoho těchto problémů se stane chronickými – dají se zmírnit, ale ne zcela vyléčit a vyžadují častou, ne-li doživotní léčbu.

Majitelé a veterináři jsou často frustrováni obtížností diagnostiky těchto případů. Vyhledejte odbornou radu veterináře, jestliže váš mazlíček projevuje jakékoliv příznaky bakteriálního kožního onemocnění a umožněte veterináři zjistit příčinu pečlivým vyšetřením a anamnézou případu s použitím moderních diagnostických metod, aby mohl rozhodnout způsob léčby.

DRUHY PYODERMII

Akné

Lidé jsou občas překvapeni, když zjistí, že psi a kočky mohou mít akné. Stejně jako u lidí, je to onemocnění postihující především zvířata v pubertě a to na bradě, pyscích, někdy na vnitřku stehen, břicha a ocasu.



Hot spot

(akutní vlhká dermatitis, zapařenina, pyotraumatická dermatitida)

Obvykle sezónní problém, když je horko a dusno. Jsou způsobeny škrábáním a kousáním kůže a to tak, že kožní bakterie nebo bakterie z prostředí se dostanou do zraněné kůže a způsobí značné poškození povrchu kůže během 12 až 24 hodin.

Folikulitida, zánět kožních záhybů a impetigo (superficiální pustulární pyodermatitida)

Zahrnuje zánětlivá vzplanutí u jinak běžných kožních bakterií. Příčina je méně závažná než předchozí případ a rovněž následek je méně dramatický. Infekce kožních záhybů se objevuje na místě, kde dochází ke tření kůže (kolem vulvy, mezi ocasem a konečníkem, v záhybech

pysků a plemen s kožními záhyby jako např. u šarpeje). Pro léčbu a prevenci onemocnění je někdy třeba celoživotní hygiena, která obnáší časté čištění těchto míst.



Hluboká pyodermie zahrnující interdigitální (meziprstní), (štěněčí) juvenilní akné, otlakovou (mozol), perianální a generalizovanou pyodermii

S výjimkou štěněčího akné, které jde obvykle snadno vyléčit (přestože to někdy trvá dva měsíce), všechny hluboké pyodermie mohou být velmi obtížně léčitelné a i úspěšně vyléčený problém se často opakuje.

Seборе

Stav kůže je typický excesivním šupinatěním a mastnotou. Abnormální sekrece mazu, která vede k maštění srsti, šupinatění, nadprodukci ušního mazu, zápachu a tvorbě lupů. Jedná se obvykle o celoživotní onemocnění a vyžaduje vůli majitele k celoživotní léčbě a péči.



PŘÍČINY BAKTERIÁLNÍ INFEKCE

Stafylokoky (bakterie) jsou nejčastější bakterie, které způsobují pyodermii u psů. Naštěstí nejsou přenosné na člověka a další domácí mazlíčky.

PŘÍZNAKY

Většinou svědivé, nažloutlé puchýřky v počátečním stádiu onemocnění, kůže psa může být zarudlá a vředovitá. S postupem onemocnění se objevují suché strupovité oblasti spolu se ztrátou srsti a kůže zapáchá.

DIAGNÓZA

Diagnóza je obvykle stanovena z anamnézy případu, vzhledu a lokalizace léze. V některých případech, může být nezbytné provést kultivaci z kůže a nechat provést testy citlivosti k antibiotikům na zjištění nejefektivnějšího antibiotika pro léčbu. Většina bakteriálních infekcí kůže je u psů sekundární k jiným onemocněním, jako jsou například parazitární nemoci, alergie, endokrinní (hormonální) poruchy nebo abnormality v imunitním systému. A proto je důležité konzultovat s vaším veterinářem tyto primární příčiny. K dosažení kompletní diagnózy mohou být nezbytné krevní testy, alergické testy nebo kožní biopsie.

LÉČENÍ

Úvodní léčba může vyžadovat vystříhání srsti v okolí léze, vykoupaní celého psa v antibakteriálním šamponu jako např. F10 germicidní léčivý šampón, poté pečlivé vysušení postižené oblasti před aplikací mastí jako např. F10 germicidní mast na jednotlivé léze. Ve většině případů jsou nasazena i systémová antibiotika minimálně na 3 až 4 týdny. K zabránění zvířatům v sebepoškození (lízání, drbání, atd.) mohou být použity bandáže a ochranné límce.

Může být nezbytné pokračovat v léčbě jako je dezinfekční šamponování, aplikace dezinfekčních mastí a podávání orálních antibiotik po delší období. Zatímco mnoho případů reaguje na léčbu dobře, opakující se pyodermie jsou běžné, částečně i proto, že jsou léčebná doporučení a kontrolní návštěvy u veterináře opomíjeny.



SNÍŽENÍ RIZIKA ONEMOCNĚNÍ

Dobrá hygiena působí preventivně a přinejmenším snižuje stupeň onemocnění. Pro pomoc při čištění a dezinfekci, která je vyzkoušena a prověřena stovkami veterinárních klinik se podívejte na následující tabulku.