

DOPORUČENÍ PRO POUŽITÍ PŘI NAKAŽLIVÝCH ONEMOCNĚNÍCH

APLIKACE	FREKVENCE	ŘEDĚNÍ NA 10L VODY	MINIMÁLNÍ EXPOZICE
BYDLENÍ Izolujte všechna zvířata, u kterých byla potvrzena infekce. Infikovaná mláďata musí být izolována s matkou. Odstraňte pelíšky a hračky, misky, apod. z klece nebo podlahy. Namočte pelíšek před praním do dezinfekce. Umyjte misky v teplé vodě a F10SCXD, pak postříkejte F10SC a nechte uschnout. Umyjte všechny povrchy (stoly, podlahy, dlaždice, atd.) F10SCXD.	Denně Denně Denně	40ml* 40ml* 40ml*	30min Nechat uschnout Nechat uschnout
PERSONÁL Se zvířaty by mělo manipulovat co nejméně lidí. Pohyb personálu musí být omezen. S infikovanými zvířaty a v infikovaném prostředí by se mělo pracovat naposledy, aby se zabránilo nakažení. Ochranný oděv by měl být denně dezinfikován a vyprán nebo zneškodněn. Správná dezinfekce rukou by měla být provedena po každé manipulaci s infikovaným zvířetem (F10 gel nebo tekoucí voda a F10 mýdlo)	Denně Mezi manipulací s jednotlivými zvířaty	40ml* 4ml bez ředění	Namáčet 30min, nechat uschnout 30 sekund
OBEČNĚ Trávník by měl být udržován posekaný a vystaven co nejvíce slunci. Přenosky by měly být umyté (F10SCXD) a dezinfikovány (F10SC) po každém použití. Úklidové pomůcky (mopy, hadry, kartáče) je třeba na konci každého dne umýt F10SCXD a dezinfikovat F10SC.	Po každém použití Po každé směně	40ml 40ml	Nechat uschnout Nechat uschnout
LÉČBA ZVÍŘAT Umyjte ihned všechna zvířata léčivým šamponem F10, abyste zabránili přenosu infekce. Opakujte třikrát po sobě obden u nemocných, týdně preventivně u zdravých zvířat. Aplikujte F10 ochrannou masť na postižené místa denně. Před nanesením masti odstraňte všechn organický materiál a starou masť pomoci F10SC (1:250).	Obden nebo dle instrukcí veterináře	Neředí se Neředí se Neředí se 40ml	Po 15 min opláchnout Po 15 min opláchnout Nechat uschnout -


*Pro parvovirové infekce použijte 80ml v 10 litrech vody

F10

PRODUCTS



VETERINÁRNÍ PRAXE



Health and Hygiene

TÉMA

DERMATOMYKÓZY

ČÍSLO 2



F10

PRODUCTS

CO JE TO DERMATOMYKÓZA?

Je to plísňové onemocnění chlupových folikulů a vrchních vrstev kůže. Obvykle začíná malým ložiskem vypadané srsti se zanícenou kůží. Vytváří charakteristické červené kroužky na kůži, které se pomalu rozšiřují a vyhojují se zevnitř kruhu.

Může se přenést PŘÍMO kontaktem s nemocným zvířetem nebo člověkem nebo NEPŘÍMO přes hračky, sprchové podložky, klobouky, hřebeny, atd.



KOHO NEJVÍCE OHROŽUJE?

Onemocnění se běžně vyskytuje u psů a koček, nejvíce u štěňat, koťat, nemocných, oslabených a starých zvířat. Kočky, které mají FIV (virus kočičí imunodeficiency) a dlouhosrsté kočky, např. perské, jsou více ohrožené. I některá plemena psů jsou k nemoci vnímavější: jorkšířští teriéři, Jack Russel teriéři a pekinézové.

Následující faktory zvyšují riziko nakažení:

- Vysoká hustota zvířat, např. útulky, velké chovy
- Zhoršená výživa
- Špatná hygiena
- Nedodržování karantény při příchodu nových zvířat
- Nemoci snižující obranyschopnost, např. cukrovka, chronické renální selhání, nádorová onemocnění, FIV a FIP
- Léčba, která snižuje obranyschopnost
- Česání a stříhání, které lehce narušuje povrch kůže
- Pravidelná účast na výstavách a častý kontakt s jinými zvířaty

NAVŠTIVTE SVÉHO VETERINÁŘE


Vědět o onemocnění je důležité především proto, že se jedná o zoonózu – choroba je přenosná ze zvířat na lidi a naopak. Mnoho zvířat se po čase uzdraví samo (příznaky ustoupí během několika měsíců). Jedná se však o vysoce nakažlivou a na lidi přenosnou chorobu, proto je na místě onemocnění léčit dle instrukcí veterináře.

LÉČBA ZVÍŘAT

Léčba zvířat je zpravidla celková, doplněna o lokální. Je velmi důležité přesně dodržovat pokyny veterináře, abychom dosáhli úplného vyléčení. Stříhání dlouhosrstých plemen konzultujte se svým veterinářem.

ZBAVTE MĚ TOHO!

Léčba nemocných zvířat je důležitá. Neméně však záleží na zabránění přenosu choroby na ostatní členy domácnosti – včetně těch dvounohých.



Často zanedbávaným, ale důležitým krokem v léčbě dermatomycózy je dekontaminace prostředí. Plísňové spory jsou ve vnějším prostředí velmi odolné a schopné přežít kolem 2 let.

K zapamatování:

- Plísňové spory ničí velmi málo dezinfekčních prostředků. Ujistěte se, že ten, který používáte je pro toto použití úspěšně otestován a zaregistrován.
- Nakažená zvířata izolujte až do okamžiku, kdy veterinář schválí, že jsou vyléčená a neinfekční
- Nakažená zvířata obstarávejte jako poslední, aby nedošlo k přenosu choroby
- Důkladně vyluxujte všechny povrchy, kde by mohly být chlupy a sáček z vysavače zneškodněte
- Vydesinfikujte všechny pelíšky, hračky, hřebeny, misky na žrádlo a na vodu, klece, kotce, záchodky, apod. (vymáchejte nebo je postříkejte F10SC)
- Zneškodněte všechno, co nelze vyluxovat, umýt nebo vyprat a vydezinfikovat
- Používejte vyčleněné potřeby na úklid a denně je dezinfikujte
- Noste ochranné oblečení, které každý den vyměňte nebo dezinfikujte



- Pečlivě si myjte ruce. Používejte účinné mýdlo (F10 mýdlo je ideální) a správnou techniku mytí rukou. Mezi manipulací s jednotlivými zvířaty použijte dezinfekční gel bez nutnosti mytí vodou (F10 gel na ruce)
- Spory se mohou roznášet klimatizací a zvířeným prachem

SNÍŽENÍ RIZIKA REINFEKCE A ŠÍŘENÍ NÁKAZY

Reinfekci a šíření nákazy můžeme zabránit výše zmíněnými opatřeními. Je však vhodné dodržovat i následující doporučení:

- Vykoupejte všechna zvířata ve fungicidním šampónu pro snížení množství spór v srsti (F10 Germicidní šampon je bezpečný pro psy a kočky všech věkových kategorií a je dostupný u každého veterináře)
- Nikdy neberte nové zvíře přímo do domácnosti (zvláště v případě chovné stanice nebo jen většího chovu zvířat) dříve, než veterinář potvrdí negativní výsledek vyšetření
- Zeptejte se svého veterináře na management chovu (zdraví a dospělí psi a kočky mohou být přenašeči bez klinických příznaků a mohou stále znovu a znovu šířit infekci v chovu)

